CO₂ 加富对黄瓜叶片显微和亚显微结构的影响

魏珉 邢禹贤 王秀峰 马红

(山东农业大学园艺学院, 泰安 271018)

摘要: 以黄瓜为试材, 研究 CO₂ 加富对叶片显微和亚显微结构的影响。结果表明: CO₂ 加富后黄瓜叶片栅栏组织厚度、表皮厚度和叶片厚度增加, 栅栏组织占叶片总厚度的比例上升, 栅栏细胞变长, 排列更加整齐紧密; 叶片叶绿体数目和大小、淀粉粒数目和大小、基粒及其片层数均增加, 单位叶绿体含淀粉粒数上升, 但叶绿体超微结构未见明显伤害。上午以不同浓度 CO₂ 加富 3 h 效应较小, 上、下午各以 1 100 ± 100 μL·L⁻¹ CO₂ 加富 3 h 效果显著。

关键词: 黄瓜; CO₂ 加富; 叶片结构

中图分类号: S 642.2 文献标识码: A 文章编号: 0513-353X (2002) 01-0030-05

CO₂ 加富提高作物光合速率的同时, 叶片结构常常对高浓度 CO₂ 环境产生适应性变化。研究表明, 提高 CO₂ 浓度引起菜豆^[1]、大豆^[2,3] 叶片厚度增加, 但机理不同。Vu 等发现 CO₂ 加富大豆, 每个叶绿体中淀粉粒数和体积仅稍有增加, 对叶绿体超微结构无明显影响^[3]。左宝玉等报道, CO₂ 倍增条件下谷子和紫花苜蓿细胞内淀粉粒大小、数目均明显增加, 并影响叶绿体基粒的大小、分布和片层数^[4]。由此可见, 不同作物种类和品种、不同试验条件下叶片结构对 CO₂ 环境适应的复杂性。本试验以黄瓜幼苗为试材, 研究 CO₂ 加富后叶片显微和亚显微结构的变化, 为叶片同化功能和黄瓜增产机理的研究奠定基础。

1 材料与方法

试验于 1999 年 10~12 月在山东农业大学园艺试验站和校本部进行。10 月 7 日播种, 营养钵 (Ø 10 cm) 育苗, 营养土按园土和有机肥 3:1 混合, 含有机质 1.45%, 速效 N 101.41 mg·kg⁻¹, 速效 P 302.49 mg·kg⁻¹, 速效 K 246.00 mg·kg⁻¹。子叶展平后 (10 月 16 日) 分别移入 4 个拱棚 (长 2.0 m, 宽 1.6 m, 高 1.0 m) 内处理。处理 I, 不加富 (对照); 处理 II, 上午加富, CO₂ 浓度 700 ± 100 μL·L⁻¹; 处理 III, 上午加富, CO₂ 浓度 1 100 ± 100 μL·L⁻¹; 处理 IV, 上午、下午均加富, CO₂ 浓度 1 100 ± 100 μL·L⁻¹。每处理 60~80 株, 肥源为钢瓶液体 CO₂, 用 GXH-305 型红外线 CO₂ 分析仪监测浓度变化。CO₂ 加富时间上午 8:00 (8:30)~11:00 (11:30), 下午 1:30 (2:00)~4:30 (5:00)。11 月 16 日将拱棚转移至玻璃温室内继续处理。12 月 2 日每处理选择典型植株 3 株, 从茎尖下数第 3 叶上切取小块分别用 FAA 或戊二醛固定。试验期间 4 个拱棚的一般管理和温光条件相同。10 月 16 日至 11 月 16 日拱棚内的最高/最低气温为 20~35℃/8~16℃, 中午 11 时平均光照强度 616.2 μmol·m⁻²·s⁻¹, 下午 2 时平均光照强度 465.4 μmol·m⁻²·s⁻¹; 11 月 17 日至 12 月 2 日最高/最低气温为 24~30℃/12~17℃, 中午 11 时平均光照强度 306.3 μmol·m⁻²·s⁻¹, 下午 2 时平均光照强度 219.2 μmol·m⁻²·s⁻¹。1999 年 2~3 月在校本部玻璃温室进行预备试验, 仅设处理 I~III, 结果基本同本次试验。

显微结构观测: 沿叶片中部主脉两侧切取 4~5 mm × 2~3 mm 长条, 先用 FAA 固定保存, 后转入 3% 戊二醛缓冲液中, 制作 GMA 半薄切片。具体步骤是: 3% 戊二醛缓冲液固定 6~12 h → 蒸馏水清洗 2 次 (每次 3 h) → 酒精梯度脱水 → GMA 预渗液处理 2 次 → GMA 包埋 → 30℃ 聚合 → LX-75 型切片机切片 → 染色 → 中性树胶封片。在 Olympus AH-II 万用显微镜 (日本制造) 下观测照相。每处理观测 20~

30 个视野, 计算平均值。

亚显微结构观测: 在叶片中部主脉两侧切取大小 1~ 2 mm 见方小块, 用 4% 戊二醛前固定, pH 7.2 磷酸缓冲液冲洗, 1% 锇酸后固定, 梯度乙醇- 丙醇脱水, Eporr-812 环氧树脂包埋, LKB-5 型超薄切片机切片, 醋酸铀- 柠檬酸铅双重染色, JEM-1200EX 型透射电镜观察、测量并照相。每处理观测 20~ 30 个视野, 取平均值。

2 结果与分析

2.1 显微结构

2.1.1 叶片厚度 CO₂ 加富引起黄瓜叶片厚度增加 (表 1)。与对照相比, 上午 CO₂ 700 ± 100 μL·L⁻¹ 和 CO₂ 1 100 ± 100 μL·L⁻¹ 加富处理黄瓜叶片的厚度分别增加 0.64% 和 3.46%, 全天 1 100 ± 100 μL·L⁻¹ CO₂ 加富叶片厚度增加 12.77%, 前二者与对照未达显著差异, 后者呈极显著差异, 说明与上午以不同浓度 CO₂ 加富 3 h 相比, 全天以 CO₂ 1 100 ± 100 μL·L⁻¹ 加富 6 h 效果更明显。

叶片厚度取决于叶肉和表皮的厚度, 而构成叶肉的组织除了栅栏组织外还有海绵组织。由表 1 看出, CO₂ 加富黄瓜叶片栅栏组织和表皮厚度同时增加, 栅栏组织厚度与叶片总厚度的比值因 CO₂ 加富略有上升。海绵组织厚度在不同加富浓度间差异不显著。

表 1 CO₂ 加富处理黄瓜叶片厚度的变化

Table 1 Changes in leaf thickness of cucumber with CO₂ enrichment

CO ₂ 浓度 CO ₂ concentration (μL·L ⁻¹)	时间 Time	叶片厚度 Leaf thickness (μm)	表皮厚度 Epidemis thickness (μm)	栅栏组织厚度 Palisade tissue thickness (μm)	海绵组织厚度 Spongy tissue thickness (μm)	栅栏组织厚度 / 叶片厚度 PT/LT
对照 Control		150.58 bB	23.24 cB	44.65 cB	83.90 bA	0.30
700 ± 100	上午 AM	151.54 bB	25.54 bAB	47.31 bB	80.13 bA	0.31
1 100 ± 100	上午 AM	155.78 bB	25.73 bAB	47.36 bB	82.92 bA	0.31
1 100 ± 100	上午+ 下午 AM+ PM	169.54 aA	26.84 aA	54.56 aA	88.35 aA	0.32

2.1.2 细胞大小 表 2 表明, CO₂ 加富使黄瓜叶片栅栏组织细胞长度增加, 但是上午 700 ± 100 μL·L⁻¹ 和 1 100 ± 100 μL·L⁻¹ 处理细胞长度分别增加 5.5% 和 5.7%, 与对照差异不显著; 全天 CO₂ 加富者增加 26.6%, 差异极显著。栅栏组织细胞宽度在不同处理间无显著差异。位于栅栏组织细胞下的第 1 层海绵细胞的长度和宽度也呈现类似的变化特征。CO₂ 加富使叶片表皮细胞宽度 (厚度) 增加, 不同加富浓度间表皮细胞长度变化不明显。全天 1 100 ± 100 μL·L⁻¹ CO₂ 加富使叶片叶肉细胞和表皮细胞在横切面上扩展明显, 细胞体积增大。

表 2 CO₂ 加富对黄瓜叶片细胞大小的影响

Table 2 Effects of CO₂ enrichment on the size of leaf cells in cucumber

(μm)

CO ₂ 浓度 CO ₂ concentration (μL·L ⁻¹)	时间 Time	栅栏细胞 Palisade cell		海绵细胞 Spongy cell		上表皮细胞 Upper epidermis cell		下表皮细胞 Lower epidermis cell	
		长度 Length	宽度 Width	长度 Length	宽度 Width	长度 Length	宽度 Width	长度 Length	宽度 Width
		对照 Control	43.76 bB	12.61 aA	24.44 bB	18.54 aA	21.61 bB	13.53 bB	15.93 bAB
700 ± 100	上午 AM	46.16 bB	13.09 aA	24.45 bB	19.05 aA	21.23 bB	14.93 aAB	15.69 bA	10.73 abAB
1 100 ± 100	上午 AM	46.26 bB	12.86 aA	25.97 bB	18.85 aA	21.72 bB	15.03 aAB	15.82 bAB	10.99 aAB
1 100 ± 100	上午+ 下午 AM+ PM	55.39 aA	13.09 aA	29.92 aA	19.14 aA	24.30 aA	15.43 aA	17.14 aA	11.64 aA

在叶片横切面上, 沿表皮平行方向, 统计 125 μm 范围内栅栏细胞和第 1 层海绵细胞的数目, 结果见图 1。1 100 ± 100 μL·L⁻¹ CO₂ 加富使叶片细胞数目显著增加, 这说明 CO₂ 加富不仅使栅栏细胞排列更加整齐、紧密, 而且促进海绵细胞排列由无序向有序转变 (图版, A~ D)。

2.2 亚显微结构

2.2.1 叶绿体和淀粉粒 由表 3 可知, CO₂ 加富条件下, 栅栏细胞内叶绿体数目增加, 体积增大。

上午 $700 \pm 100 \mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $1100 \pm 100 \mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$ CO_2 加富处理使每个细胞含叶绿体数分别比对照增加 16.90% 和 27.46%，全天加富增加 25.64%；上午以不同浓度 CO_2 加富者叶绿体体积增加较小，全天加富者增加显著，其长度和宽度分别比对照增加 8.36% 和 26.49%。以上结果说明 CO_2 加富促进黄瓜叶绿体的形成和发育。

CO_2 加富使叶片栅栏细胞内淀粉粒数目增多，体积增大（表 3，图版，E~H），说明其合成并积累了更多的碳水化合物。对照平均每个叶肉细胞含 9.14 个淀粉粒，每个叶绿体不到 1 个，且体积较小；上午 $700 \pm 100 \mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $1100 \pm 100 \mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$ CO_2 加富处理使每个细胞内淀粉粒数分别增加到 16.22 个和 23.72 个，平均每叶绿体含 1~2 个；全天 CO_2 加富黄瓜叶肉细胞内淀粉粒数目进一步增加，每个叶绿体含 2~3 个，且体积显著增大。

图 1 CO_2 加富对黄瓜叶片栅栏、海绵细胞数目的影响
(125 μm 叶片长度)

Fig. 1 Effects of CO_2 enrichment on the number of palisade and spongy cells in 125 μm length of cucumber leaves

表 3 CO_2 加富处理黄瓜叶片叶绿体、淀粉粒数目及大小变化

Table 3 Number and size of chloroplast and starch grain in leaves of cucumber with CO_2 enrichment

CO_2 浓度 CO_2 concentration ($\mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$)	时间 Time	叶绿体 Chloroplast		淀粉粒数/叶肉细胞 Starch grain number		淀粉粒 Starch grain	
		叶绿体数/叶肉细胞 Chloroplast number / cell	长度 Length (μm)	宽度 Width (μm)	长度 Length (μm)	宽度 Width (μm)	
对照 Control		10.92 cB	5.61 bA	1.85 bA	9.14 dB	0.59 cC	0.23 cC
700 ± 100	上午 AM	12.77 bA	6.17 abA	1.94 bA	16.22 cB	1.70 bB	0.88 bB
1100 ± 100	上午 AM	13.92 aA	5.86 abA	1.90 bA	23.72 bA	1.86 bB	0.87 bB
1100 ± 100	上午+ 下午 AM+ PM	13.72 aA	6.64 aA	2.34 aA	29.00 aA	2.76 aA	1.54 aA

2.2.2 基粒和片层 CO_2 加富不仅影响叶绿体大小和数目，而且影响其结构。加富处理叶片叶绿体内基粒数目增加（未达显著差异水平）；片层数增加，基粒明显变厚，说明类囊体垛叠程度高，含多个片层的基粒增多（表 4）。基粒片层密度随 CO_2 加富浓度增加和时间延长而降低，但这是由于片层厚度的增加还是片层间隙的增大，尚需探讨。

表 4 CO_2 加富对黄瓜叶绿体基粒及其片层的影响

Table 4 Effects of CO_2 enrichment on grana and lamellae of chloroplast in cucumber

CO_2 浓度 CO_2 concentration ($\mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$)	时间 Time	基粒数/叶绿体 Grana number/ chloroplast	基粒厚度 Grana thickness (μm)	片层数/基粒 Lamella number/ grana	片层密度 Lamella number/ μm^2
		对照 Control	15.55 aA	0.135 bB	10.39 bB
700 ± 100	上午 AM	15.64 aA	0.163 aAB	12.06 abAB	73.96 bB
1100 ± 100	上午 AM	16.36 aA	0.183 aA	13.22 aA	72.25 aA
1100 ± 100	上午+ 下午 AM+ PM	17.18 aA	0.173 aA	12.33 aAB	71.29 aA

3 讨论

CO_2 加富引起黄瓜叶片厚度增加，这与对菜豆、大豆的研究结果相同，但叶厚增加的原因不同。Radoglou 等试验表明，菜豆叶片厚度增加主要由于叶肉，尤其是海绵薄壁组织的变化所致，栅栏组织与海绵组织的比值并不改变，叶肉细胞体积变大，尤其在横切面上扩展明显，而栅栏细胞层数、表皮细胞密度、气孔密度和气孔指数不受影响^[1]。大豆叶片厚度增加源于栅栏细胞层的良好发育和细胞数目的增加^[3]。在 CO_2 倍增环境中生长的大豆，叶片下表面覆盖大量的星状表面角质蜡层，叶肉因增加

了一层栅栏组织而明显变厚, 气孔密度下降^[2]。本试验中, CO₂ 加富黄瓜叶片增厚则是叶肉和表皮厚度同时增加的结果, 栅栏细胞层数不变但明显伸长, 栅栏组织占叶片厚度的比例上升, 细胞排列更加整齐紧密, 与栅栏组织相接的海绵组织细胞排列也趋于有序。由此看出, 不同作物叶片结构对提高 CO₂ 浓度的适应性机制不同, 细胞分裂和细胞扩张均可能成为引起变化的原因。提高 CO₂ 浓度对不同作物叶片叶绿体超微结构的影响也不一样。CO₂ 加富黄瓜叶肉细胞内叶绿体、淀粉粒数目增加, 体积增大, 基粒数和片层数增加, 但每个叶绿体所含淀粉粒数很少超过 3 个, 未影响叶绿体正常的超微结构。CO₂ 加富番茄叶片中淀粉粒大小、数目增加, 类囊体变形也仅限于韧皮部细胞中的极少数叶绿体^[5]。但是, CO₂ 倍增条件下谷子和紫花苜蓿中淀粉粒大小、数目均增加, 且淀粉粒体积和数量影响叶绿体基粒的大小、分布和片层数^[4]。

根据本研究结果, CO₂ 加富促进黄瓜叶片和叶绿体的发育。前人研究表明, 苜蓿叶片光合速率取决于叶肉和栅栏组织厚度^[6]; 大豆叶片叶绿体基粒片层数与光合速率正相关^[7]。基粒片层叠意味着捕获光能机构的高度密集, 同时作为酶的排列支架, 有利于形成一个长的代谢传送带, 促进光能的吸收传递和转换。因此, CO₂ 加富条件下黄瓜叶片显微和亚显微结构的变化可能是对高浓度 CO₂ 的适应, 以提高对光能和环境 CO₂ 的吸收利用能力; 另一方面, 高 CO₂ 浓度下黄瓜叶片的光合速率提高, 制造和积累更多的碳水化合物, 为叶片结构发育奠定了基础。对此尚需进一步探讨。虽然上午以不同浓度 CO₂ 加富对黄瓜叶片结构都产生了一定影响, 但部分指标与对照并无显著差异, 而全天 CO₂ 加富叶片结构变化明显, 这说明延长 CO₂ 加富时间作用更大。

参考文献:

- 1 Radoglou K M, Jarvis P G. The effects of CO₂ enrichment and nutrient supply on growth morphology and anatomy of *Phaseolus vulgaris* L. seedlings. *Ann. Bot.*, 1992, 70: 245~ 256
- 2 林金星, 胡玉熏. 大豆叶片结构对 CO₂ 浓度升高的反应. *植物学报*, 1996, 38 (1): 31~ 34
- 3 Vu J C V, Allen L H Jr, Bowes G. Leaf ultrastructure, carbohydrates and protein of soybeans grown under CO₂ enrichment. *Environ. Exp. Bot.*, 1989, 29 (2): 141~ 147
- 4 左宝玉, 姜桂珍, 白克智, 等. CO₂ 浓度倍增对谷子和紫花苜蓿叶绿体超微结构的效应. *植物学报*, 1996, 38 (1): 72~ 76
- 5 Yelle S, Beeson R C Jr, Trudel M J, et al. Acclimation of two tomato species to high atmospheric CO₂. *Plant Physiol.*, 1989, 90: 1465~ 1472
- 6 Delayney R H. Morphological and anatomical features of alfalfa leaves related to CO₂ exchange. *Crop Sci.*, 1974, 14: 444~ 447
- 7 许守民, 苗以农. 大豆不同生殖生长期不同冠层光合活性差异与叶片结构关系探讨. *作物学报*, 1992, 18 (3): 191~ 195

Effects of CO₂ Enrichment on the Microstructure and Ultrastructure of Leaves in Cucumber

Wei Min, Xing Yuxian, Wang Xiufeng, and Ma Hong

(College of Horticulture, Shandong Agricultural University, Tai'an 271018)

Abstract: The microstructure and ultrastructure of leaves in cucumber with CO₂ enrichment were investigated. It showed that the thickness of palisade tissue, epidermis and leaf increased simultaneously in CO₂ enriched leaves, and the ratio of palisade tissue to leaf thickness went up slightly. Longer and more tightly arranged palisade cells were observed in leaves with CO₂ enrichment. Not only the number and size of chloroplast and starch grain, but also the number of grana and lamella increased as a result of CO₂ enrichment. No obvious chloroplast deterioration and thylakoid deformation were found in CO₂ enriched leaves. Enrichment at different CO₂ concentrations for three hours in morning was not very effective, but enrichment for six hours at 1 100 ± 100 μL·L⁻¹ everyday produced most significant effects.

Key words: Cucumber; CO₂ enrichment; Leaf structure

图版说明 A~D 叶片显微结构 (150×); E~H 叶片超微结构 (10 000×)。A、E, 对照; B、F, CO₂ 700±100 μL·L⁻¹, 上午加富; C、G, CO₂ 1100±100 μL·L⁻¹, 上午加富; D、H, CO₂ 1100±100 μL·L⁻¹, 上午+ 下午加富。

Explanation of plate A- D leaf microstructure (150×); E- H leaf ultrastructure (10 000×). A, E, CK; B, F, CO₂ 700±100 μL·L⁻¹ AM; C, G, CO₂ 1100±100 μL·L⁻¹ AM; D, H, CO₂ 1100±100 μL·L⁻¹ AM+ PM.